**Table 6. Calculated accumulation rates for the benthis foraminifer species from Hole 929A.**

| Core, section, interval (cm) | Depth (m) | Depth (mcd) | Age (Ma) | *Abditodentrix pseudothulmani* | *Alabaminella weddellensis* | *Anomalinoides globosus* | *Astrononion echolsi* | *Bolivina pacifica* | *Bolivina* spp. | *Bulimina* sp. A | *Cassidulina* spp. | *Cibicidoides bradyi* | *Cibicidoides kullenbergi* | *Cibicidoides lobertulus* | *Cibicidoides mundulus* | *Cibicidoides robertsonianus* | *Cibicidoides wuellerstorfi* | *Discorbinella bertheloti* | *Epistominella exigua* | *Epistominella* sp. A | *Globocassidulina subglobosa* | *Gyroidina lamarckiana* | *Gyroidina regularis* | *Gyroidina* spp. | *Gyroidina umbonata* | *Gyroidinoides neosoldanii* | *Gyroidinoides orbicularis* | *Ioanella tumidula* | *Laticarinina pauperata* | *Melonis barleeanus* | *Melonis pompilioides* | *Nodogenerina* sp. | *Nonionella* sp. | *Nuttallides umbonifera* | *Oridorsalis tener* | *Oridorsalis umbonatus* | *Oridorsalis* sp. | *Orthomorphina* sp. | *Pleurostomella* spp. | *Pseudoparrella* sp. | *Pullenia bulloides* | *Pullenia osloensis* | *Pullenia quinqueloba* | *Pullenia zaandamae* | *Pullenia* spp. | *Pyrgo murrhina* | *Pyrgo* spp. | *Schackoinella* sp. | *Siphonaxularia caternata* | *Sphaeroidina bulloides* | *Stainforthia fusiformis* | *Tosaia hanzawai* | *Uvigerina hispida* | *Uvigerina peregrina* | *Uvigerina* spp. | Miliolids | Thin wall miliolids | Unilocular species | Others | Total | Wet weight (g) | Coarse fraction weight (g) | Coarse fraction ratio (%) | GRAPE density (cm³) | Sedimentation rate (cm/1000 yr.) |
|---|---|---